

転倒・転落(発見)報告書 (様式1)

患者	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 年齢 歳(か月) <input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来 <input type="checkbox"/> その他
発生場所	<input type="checkbox"/> 病室 <input type="checkbox"/> ステーション <input type="checkbox"/> 廊下 <input type="checkbox"/> 浴室 <input type="checkbox"/> 洗面所 <input type="checkbox"/> 便所 <input type="checkbox"/> 診察室 <input type="checkbox"/> 処置室 <input type="checkbox"/> リハビリ室 <input type="checkbox"/> レントゲン室 <input type="checkbox"/> 透析室 <input type="checkbox"/> その他()
発生時行為	<input type="checkbox"/> 排泄しようとして <input type="checkbox"/> 物をとろうとして <input type="checkbox"/> 食堂に出ようとして <input type="checkbox"/> 部屋に帰ろうとして <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> その他()
主病名	<input type="checkbox"/> 脳血管疾患 <input type="checkbox"/> 認知症 <input type="checkbox"/> パーキンソン病 <input type="checkbox"/> 筋骨格系疾患 <input type="checkbox"/> 呼吸器疾患 <input type="checkbox"/> 心疾患 <input type="checkbox"/> 精神科疾患 <input type="checkbox"/> その他()
ADL	<input type="checkbox"/> ランク J(自立) <input type="checkbox"/> ランク A(ほぼ自立しているが外出は介助が必要) <input type="checkbox"/> ランク B(全般に介助が必要) <input type="checkbox"/> ランク C(ベッド上で過ごす)
生活自立度判定基準	(認知症高齢者の日常生活自立度判定基準参照) <input type="checkbox"/> ランク I <input type="checkbox"/> ランク II <input type="checkbox"/> ランク IIa <input type="checkbox"/> ランク IIb <input type="checkbox"/> ランク III <input type="checkbox"/> ランク IIIa <input type="checkbox"/> ランク IIIb <input type="checkbox"/> ランク IV <input type="checkbox"/> ランク M
経過	
事前対策	
事後対策	

発生(発見)日時:令和 年 月 日(曜日) 時 分 報告部署()

リスクの評価(リスクマネージャー記載)

----- LV.0 LV.1 LV.2 LV.3a LV.3b LV.4a LV.4b LV.5 -----

転倒・転落アセスメントシート(病棟はカルテ入力後、印刷添付で可)

項目	危険因子	評価スコア	
A. 年齢	・75歳以上、6歳以下	2	
B. 既往歴	・転倒したことがある ・転落したことがある ・失神 ・けいれん ・脱力発作	2	
C. 身体的障害	・麻痺 ・筋力低下 ・ふらつき ・突進歩行 ・しびれ(知覚障害・感覚障害) ・骨、関節の異常(拘縮・変形・欠損など) ・日常生活に影響を及ぼすような聴力障害 ・日常生活に影響を及ぼすような視力障害 ・日常生活に影響を及ぼすような疼痛 ・付属品(点滴・ドレーン・チューブ類など)	3	
D. 認知的障害	・認知症 ・不穏行動(多動・徘徊) ・見当識障害 ・意識混濁 ・うつ状態 ・混乱 ・判断力、理解力、注意力、記憶力の低下	4	
E. 活動状況	・車椅子、杖、歩行器使用 ・移動に介助が必要 ・活動耐性低下(貧血、低酸素など) ・姿勢の異常	3	
F. 薬剤	睡眠薬	各 1	
	麻薬		
	鎮静剤		
	降圧・利尿剤		
	向精神薬(睡眠薬を除く)		
	抗パーキンソン剤		
	血糖降下剤		
	抗がん剤		
	浣腸・緩下剤		
	抗血小板剤・抗血液凝固剤		
	多剤併用(上記薬剤の中の併用)		
G. 排泄	トイレ介助が必要	各 1	
	ポータブルトイレ使用		
	夜間トイレに起きる		
	頻尿		
	排泄行動に時間がかかる		
	尿・便失禁がある		
	尿道カテーテル留置		
	尿道カテーテル抜去後		
H. トリガー	患者が気にしていることがある	各 1	
	急な環境の変化		
		合計点数	